

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI INSERIMENTO DI UN DISPOSITIVO INTRAUTERINO
A SCOPO CONTRACCETTIVO (IUD Cu380Ag)**

Io sottoscritta nata a
il..... dichiaro di essere stata informata il..... dal dr.

DOPO IL COLLOQUIO ILLUSTRATIVO DEI VARI METODI CONTRACCETTIVI (CONTRACCZIONE ORMONALE - pillola, anello vaginale, cerotto contraccettivo -, CONTRACCZIONE MECCANICA CON IUD O PROFILATTICO, STERILIZZAZIONE CHIRURGICA) E LA VALUTAZIONE ANAMNESTICO CLINICA

RICHIEDO L'INSERIMENTO DI UN DISPOSITIVO INTRAUTERINO A SCOPO CONTRACCETTIVO (SPIRALE)

INFORMAZIONI GENERALI

LA SPIRALE (IUD) È UN DISPOSITIVO CHE UNA VOLTA APPLICATO NELLA CAVITÀ UTERINA OSTACOLA LA FECONDAZIONE E QUINDI EVITA UNA GRAVIDANZA.

DOPO L'INSERIMENTO DELLA SPIRALE E' RACCOMANDATO OSSERVARE ALCUNE ORE DI RIPOSO ED ASTENERSI DAI RAPPORTI SESSUALI PER I PRIMI 15 GIORNI. E' NECESSARIO EFFETTUARE IL PRIMO CONTROLLO GINECOLOGICO DOPO 4 SETTIMANE E, IN SEGUITO, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO.

ANCHE SE RARAMENTE LO IUD PUO' SPOSTARSI DALLA SUA SEDE O ESSERE ESPULSO: L'ESPULSIONE PUO' VERIFICARSI PIU' FACILMENTE NEL PRIMO ANNO (IN MENO DEL 10% DEI CASI).

TALVOLTA IL FILO DELLO IUD RISALE DENTRO L'UTERO: IN QUESTO CASO PUO' ESSERE NECESSARIA LA SUA RIMOZIONE IN OSPEDALE.

LA SPIRALE **NON** SERVE A PROTEGGERE DALLE INFEZIONI CHE SI POSSONO TRASMETTERE DURANTE IL RAPPORTO SESSUALE.

EFFICACIA

LA PERCENTUALE DI INSUCCESSO È INTORNO ALL'1%: QUINDI SU 100 DONNE CHE UTILIZZANO LA SPIRALE 1 (UNA) DONNA RIMANE INCINTA NONOSTANTE IL SUO UTILIZZO.

LO SPOSTAMENTO E L'ESPULSIONE ANNULLANO L'EFFICACIA CONTRACCETTIVA DELLA SPIRALE.

LA SPIRALE E' EFFICACE PER 5 ANNI POI DEVE ESSERE TOLTA DAL GINECOLOGO.

I RISCHI

LA SPIRALE MENTRE VIENE INSERITA PUÒ PENETRARE NELLA CAVITÀ UTERINA O PERFORARLA: LA POSSIBILITÀ CHE QUESTO SUCCEDA È INFERIORE A 1 CASO OGNI 1000 INSERIMENTI.

DURANTE L'APPLICAZIONE DELLA SPIRALE SI POSSONO AVERE VARIAZIONI DEL BATTITO CARDIACO E DELLA PRESSIONE ARTERIOSA PER STIMOLAZIONE NERVOSA DELL'UTERO. IN RARISSIMI CASI SI PUÒ VERIFICARE UN COLLASSO (SHOCK VAGALE)

GLI EFFETTI COLLATERALI

GLI EFFETTI COLLATERALI CHE POSSONO VERIFICARSI IN RARI CASI DOPO L'INSERIMENTO DELLA SPIRALE SONO:

- PERDITE DI SANGUE AL DI FUORI DELLE MESTRUAZIONI,
- MESTRUAZIONI PIÙ ABBONDANTI, PIÙ LUNGHE E PIÙ DOLOROSE,
- DOLORE PELVICO (A LIVELLO DEL BASSO VENTRE).



Ho richiesto le seguenti ulteriori informazioni:

- 1. DOMANDA:.....
RISPOSTA.....

- 2. DOMANDA:.....
RISPOSTA.....

Ritengo l'informazione ricevuta e le risposte chiare ed esaurienti.

Firma della donna richiedente
Firma del medico Data

**CONSENSO RELATIVO ALL'INSERIMENTO DI UN DISPOSITIVO INTRAUTERINO
A SCOPO CONTRACCETTIVO (IUD Cu380Ag)**

IO.....
ACCONSENTO / NON ACCONSENTO all'inserimento del dispositivo intrauterino

Firma della donna richiedente Data

INFORMAZIONE DATA ALLA DONNA TRAMITE INTERPRETE / MEDIATORE CULTURALE

Nome e Cognome (stampatello).....
Firma.....documento.....Data.....

Nome e Cognome (stampatello).....
Firma.....documento.....Data.....

