

Trieste,

Cognome Nome

PREPARAZIONE SCINTIGRAFIA METAIODIOBENZILGUANIDINA 123-IODIO MIBG ADULTI

- 1) **Dieta prevalentemente proteica e carboidratica** (evitare frutta, verdure, legumi) da eseguire **2 giorni prima** della somministrazione endovenosa del **123-Iodio MIBG e fino a 1 giorno** dopo la somministrazione endovenosa del **123-Iodio MIBG**
- 2) **Assunzione di blandi lassativi** (mannitolo) **3 giorni prima** della somministrazione del del **123-Iodio MIBG** per eseguire una toilette intestinale;
- 3) **Clisma evacuativo la mattina dell'acquisizione dell'esame alla 24° ora**
- 4) **Digiuno il giorno dell'acquisizione dell'esame**
- 5) **premedicazione con soluzione di Lugol forte 5% (15 g.tt /die) 24 ore e 30 minuti prima dell'esame e 24 ore dopo, per evitare l'irradiazione della tiroide ;**
- 6) **Nel caso di pazienti allergici allo iodio** si può ricorrere al **perclorato di potassio** (es. Pertiroid). Nell'adulto sono necessari **200 mg per 4 volte al giorno**, vista la cinetica piuttosto rapida del perclorato, iniziando da 60 a 30 minuti prima della somministrazione del radiofarmaco

LA SOMMINISTRAZIONE 30 MINUTI PRIMA DELL'ESAME VERRÀ EFFETTUATA IN MEDICINA NUCLEARE.

DATA SOMMINISTRAZIONE :

DATA ACQUISIZIONE IMMAGINI SCINTIGRAFICHE:

Il Direttore
Dott.ssa Franca Dore