

Quando eseguire la seconda somministrazione?

Dopo la prima somministrazione le verrà dato un appuntamento **entro 42 giorni** per eseguire la seconda dose del vaccino.

È fondamentale eseguire entrambe le dosi del vaccino: **una sola dose non protegge dal virus.**

Se non si sente bene quando deve eseguire la seconda dose, aspetti fino a completa ripresa.



Segnalazione di reazioni avverse

Qualora dopo la somministrazione del vaccino abbia sviluppato una reazione avversa, può segnalarlo lei direttamente tramite la piattaforma Vigifarmaco (www.vigifarmaco.it).


Ulteriori informazioni

Il vaccino che ha ricevuto riduce la possibilità di ammalarsi di COVID-19, ma non azzerava il rischio.

La protezione data dal vaccino inizierà **7 giorni** dopo la seconda dose.

Continui ad adottare le seguenti precauzioni per evitare il contagio:

1. Allontanamento sociale
 2. Indossare la mascherina
 3. Lavare spesso le mani in modo accurato
- Conservare la green-card consegnata dopo la prima somministrazione e **presentarla il giorno della seconda dose.**



Cosa aspettarsi dopo la vaccinazione COVID-19 Vaccino COMIRNATY®

Possibili effetti indesiderati

Molto comuni

- dolore, arrossamento, gonfiore nel sito di iniezione
- stanchezza
- mal di testa
- dolori muscolari
- brividi
- dolori articolari
- febbre
- diarrea


Non comuni

- ingrossamento dei linfonodi
- eruzione cutanea o prurito

Rare

Reazioni allergiche che includono:

- orticaria (protuberanze sulla pelle spesso molto pruriginose)
- gonfiore del viso, della lingua o della gola;



Non presentarsi alla vaccinazione se:

- prima della vaccinazione ha sintomi riconducibili al COVID-19
- è in isolamento fiduciario
- è in attesa del risultato di un tampone



Ci si può ammalare di COVID-19 a causa del vaccino?

No, ma è possibile che lei sia stato contagiato prima della vaccinazione e non abbia manifestato i sintomi.

Dopo il vaccino si possono svolgere le normali attività quotidiane?

Sì, tenendo conto delle seguenti raccomandazioni:

- qualora il braccio sia dolorante, eviti di sollevare carichi
- in caso di stanchezza, riposi ed eviti di utilizzare macchinari o di guidare

In caso di febbre, assumere paracetamolo 500 mg al bisogno (massimo 3.000 mg al giorno divisi in 6 somministrazioni).

In caso di febbre alta, se i sintomi persistono più di 7 giorni o se peggiorano, contattare il medico.

