

ALLEGATO 1 AL MODULO DI CONSENSO VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 / PRILOGA 1 K OBRAZCU ZA SOGLASJE ZA CEPLJENJE PROTI COVIDU-19

NOTA INFORMATIVA / INFORMATIVNI LIST O CEPIVU

NUVAXOVID (Novavax)

Cos'è Nuvaxovid e a cosa serve	Kaj je cepivo Nuvaxovid in čemu je namenjeno
Nuvaxovid è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2. Nuvaxovid viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 18 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e globuli bianchi specializzati per contrastare il virus, allo scopo di fornire protezione contro COVID-19. Nessuno dei componenti di questo vaccino può causare COVID-19.	Cepivo proti COVIDU-19 Nuvaxovid se uporablja za preprečevanje bolezni covid-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Cepivo Nuvaxovid se daje odraslim in mladostnikom, starim 18 let ali več. Cepivo povzroči, da imunski sistem (naravni obrambni sistem telesa) tvori protitelesa in bele krvne celice, ki so specializirane v boju proti virusu z namenom zaščite pred COVIDOM-19. Nobena sestavina tega cepiva ne more povzročiti bolezni COVID-19.
Cosa deve sapere prima di ricevere Nuvaxovid	Kaj morate vedeti, preden boste prejeli cepivo Nuvaxovid
Nuvaxovid non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati di seguito).	Cepiva Nuvaxovid ne smete prejeti, če ste alergični na učinkovino ali katero koli drugo sestavino tega zdravila (navedeno spodaj).
Avvertenze e precauzioni	Opozorila in previdnostni ukrepi
Si rivolga al medico o all'operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:	Pred cepljenjem se posvetujte z zdravnikom ali zdravstvenim delavcem v cepilnem centru, če:
ha avuto una grave reazione allergica o da mettere a rischio la vita dopo aver ricevuto qualsiasi altro vaccino per iniezione o dopo che le è stato somministrato Nuvaxovid in passato;	ste imeli hudo ali smrtno nevarno alergijsko reakcijo po prejemu kateregakoli drugega cepiva z injekcijo ali po prejemu cepiva Nuvaxovid;
è svenuto dopo un'iniezione;	ste po injiciranju omedleli;
ha febbre alta (oltre 38°C) o un'infezione grave. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un'infezione delle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;	imate visoko vročino (čez 38°C) ali hudo okužbo. Vseeno pa se lahko cepite, če imate rahlo zvišano telesno temperaturo ali okužbo zgornjih dihal, kot npr. prehlad;
ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per prevenire la formazione di coaguli di sangue;	imate težave s strjevanjem krvi, se vam zlahka pojavijo modrice ali uporabljate zdravila za preprečevanje krvnih strdkov;

il suo sistema immunitario non funziona correttamente (immunodeficienza) o se sta assumendo medicinali che indeboliscono il sistema immunitario (come corticosteroidi a dosi elevate, immunodepressori o medicinali contro i tumori).	vaš imunski sistem ne deluje pravilno (imunska pomanjkljivost) ali če jemljete zdravila, ki oslabijo imunski sistem (kot so visoki odmerki kortikosteroidov, imunosupresivi ali zdravila za zdravljenje raka).
Altri medicinali e Nuvaxovid	Sočasna uporaba drugih zdravil in cepiva Nuvaxovid
Informi il medico o l'operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.	Če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo oz. ste se pred kratkim cepili, o tem obvestite zdravnika ali zdravstvenega delavca cepilnega centra.
Gravidanza e allattamento	Nosečnost in dojenje
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.	Če ste noseči, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev oziroma dojite, se posvetujte z zdravnikom, preden vas cepijo.
I dati relativi all'uso di Nuvaxovid in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale.	Podatki v zvezi z uporabo cepiva Nuvaxovid pri nosečnicah so omejeni. Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na nosečnost, razvoj zarodka/ploda, porod in poporodni razvoj.
Durata della protezione e limitazioni dell'efficacia del vaccino	Trajanje zaščite in omejitve učinkovitosti cepiva
La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. Come per tutti i vaccini, il ciclo di vaccinazione con 2 dosi di Nuvaxovid potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono e la durata della protezione non è nota.	Trajanje zaščite, ki jo zagotavlja cepivo, ni znano, saj o tem še vedno potekajo klinična preskušanja. Tako kot velja za vsa cepiva, tudi cikel z 2 odmerkoma cepiva Nuvaxovid morda ne bo v celoti zaščril vseh prejemnikov in trajanje zaščite ni znano.
È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).	Zato je bistvenega pomena, da še naprej dosledno upoštevate priporočila za javno zdravje (uporaba zaščitne maske, upoštevanje medosebne razdalje in pogosto umivanje rok).
Come viene somministrato Nuvaxovid	Kako se daje cepivo Nuvaxovid
Nuvaxovid viene somministrato sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata 3 settimane dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.	Cepivo Nuvaxovid se injicira intramuskularno v zgornji del roke. Predvidena je ponovitev cepljenja. Priporočljivo je, da drugi odmerek istega cepiva prejmete 3 tedne po prvem odmerku in tako dokončate serijo cepljenja.
È molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora	Zelo pomembno je, da prejmete drugi odmerek cepiva, saj si tako zagotovite optimalen imunski odziv. Če bi se na dogovorjeni datum

<p>dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.</p>	<p>pozabili vrniti za drugi odmerek, se obrnite na svojega zdravnika ali na cepilni center, kjer ste bili cepljeni prvič.</p>
<p>Possibili effetti indesiderati</p>	<p>Možni neželeni učinki</p>
<p>Come tutti i medicinali, Nuvaxovid può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. La maggior parte degli effetti indesiderati scompare entro pochi giorni dall'insorgenza. Se i sintomi persistono, si rivolga al medico, al farmacista o al infermiere.</p> <p>Come per altri vaccini potrebbe avvertire dolore o disagio nel punto di iniezione oppure potrebbe osservare un certo rossore e gonfiore in corrispondenza di questo punto. Tutta via, queste reazioni scompaiono generalmente entro pochi giorni.</p> <p>Si rivolga urgentemente a un medico se accusa uno qualsiasi dei seguenti segni e sintomi di reazione allergica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sensazione di svenimento o capogiro • alterazioni del battito cardiaco • respiro affannoso • respiro sibilante • gonfiore delle labbra, del viso o della gola • orticaria o eruzione cutanea • nausea o vomito • dolore allo stomaco 	<p>Kot vsa zdravila ima lahko tudi cepivo Nuvaxovid neželene učinke, ki pa se ne pojavi pri vseh osebah. Večina neželenih učinkov izgine v nekaj dneh po pojavu. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinskim osebjem.</p> <p>Tako kot pri drugih cepivih lahko na mestu injiciranja občutite bolečino ali nelagodje ali pa na tej točki opazite nekaj pordelosti in otekline. Vendar pa te reakcije običajno izginejo v nekaj dneh.</p>
<p>Si rivolga al medico o all'infermiere se dovesse manifestarsi qualsiasi altro effetto indesiderato. Questi possono essere:</p> <p>Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):</p> <ul style="list-style-type: none"> • cefalea • nausea o vomito • dolori muscolari • dolori articolari • dolore o dolorabilità nel punto in cui vene eseguita l'iniezione • sensazione di estrema stanchezza (affaticamento) • malessere generale 	<p>Nujno obiščite zdravnika, če imate katerega od naslednjih znakov in simptomov alergijske reakcije:</p> <ul style="list-style-type: none"> • občutek omedlevice ali omotičnosti • spremembe srčnega utripa • težko dihanje • piškajoče dihanje • otekanje ustnic, obraza ali grla • urtikarija ali kožni izpuščaj • slabost ali bruhanje • bolečine v trebuhu <p>Če se pojavi kateri koli drug neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali medicinskim osebjem. To so lahko:</p> <p>Zelo pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):</p> <ul style="list-style-type: none"> • glavobol • slabost ali bruhanje • bolečine v mišicah • bolečine v sklepih • bolečina ali občutljivost na mestu injiciranja • občutek skrajne utrujenosti • splošno slabo počutje
<p>Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):</p> <ul style="list-style-type: none"> • arrossamento nel sito di iniezione 	<p>Pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):</p> <ul style="list-style-type: none"> • pordelost na mestu injiciranja • oteklina na mestu vboda

<ul style="list-style-type: none"> gonfiore nel punto in cui viene eseguita l'iniezione febbre ($>38^{\circ}\text{C}$) brividi dolore o disagio nel braccio, nella mano, nella gamba, e/o nel piede (dolore agli arti) 	<ul style="list-style-type: none"> zvišana telesna temperatura ($> 38^{\circ}\text{C}$) mrzlica bolečina ali nelagodje v roki, nogi in/ali stopalu (bolečine v okončinah)
<p>Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):</p> <ul style="list-style-type: none"> ingrossamento dei linfonodi ipertensione prurito sulla pelle, eruzione cutanea oppure orticaria rossore della pelle prurito sulla pelle nel punto in cui viene eseguita l'iniezione 	<p>Občasni neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):</p> <ul style="list-style-type: none"> povečane bezgavke hipertenzija srbenje kože, izpuščaj ali urtikarija pordelost kože srbenje na koži na mestu vboda
<p>Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.</p> <p>Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione (https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse).</p>	<p>Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, tudi take, ki niso navedeni v tem navodilu, se posvetujte s svojim zdravnikom ali se obrnite na cepilni center.</p> <p>O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno prek nacionalnega sistema za poročanje (https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-rezioni-avverse).</p>
Cosa contiene Nuvaxovid	Kaj vsebuje cepivo Nuvaxovid
<p>Il principio attivo è la proteina spike di Sars-CoV-2, prodotta tramite tecnologia del DNA ricombinante, con adiuvante Matrix-M.</p> <p>Matrix-M è incluso in questo vaccino come adiuvante. Gli adiuvanti sono sostanze contenute in alcuni vaccini per accelerare, migliorare e/o prolungare gli effetti protettivi del vaccino.</p>	<p>Zdravilna učinkovina je beljakovina spike Sars-CoV-2, pridobljena s tehnologijo rekombinantne DNK z adjuvansom Matrix-M.</p> <p>Matrix-M je vključen v to cepivo kot adjuvans. Adjuvansi so snovi, ki jih vsebujejo nekatera cepiva za pospeševanje, izboljšanje in/ali podaljšanje zaščitnih učinkov cepiva.</p>
<p>Gli altri componenti (eccipienti) contenuti in Nuvaxovid sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> disodio idrogeno fosfato eptaidrato sodio diidrogeno fosfato monoidratato disodio idrogeno fosfato diidrato sodio cloruro polisorbato 80 colesterolo fosfatidilcolina (incluso α-tocoferolo tutto racemico) potassio diidrogeno fosfato potassio cloruro sodio idrossido (per l'aggiustamento del ph) 	<p>Druge sestavine cepiva Nuvaxovid so:</p> <ul style="list-style-type: none"> dinatrijev hidrogenfosfat heptahidrat natrijev dihidrogen fosfat monohidrat dinatrijev hidrogenfosfat dihidrat natrijev klorid polisorbat 80 holesterol fosfatidilholin (vključno α-tokoferolo celotno racemičen) Kalijev dihidrogen fosfat kalijev klorid natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) klorovodikova kislina (za uravnavanje pH)

<ul style="list-style-type: none">• acido cloridrico (per l'aggiustamento del ph)• acqua per preparazioni iniettabili	<ul style="list-style-type: none">• voda za injekcije
--	---