

Drugi domerek?

NE, cepljenje s cepivom Janssen COVID-19 vaccine opravimo le z **enim** odmerkom.



Prijava neželenih učinkov po cepljenju

Morebitne neželene učinke po cepljenju lahko prijavite na platformi Vigifarmaco (www.vigifarmaco.it).

Dodatne informacije

Cepivo, ki ste ga prejeli, zmanjšuje možnost, da zbolite za covidom-19, vendar tveganja ne izniči.


Zaščita, ki jo zagotavlja cepivo, se začne vzpostavljati **14 dni** po opravljenem cepljenju.

Še naprej upoštevajte priporočila za preprečevanje širjenja okužbe:

1. omejevanje socialnih stikov
2. nošenje maske
3. pogosto umivanje rok



Brošuro je pripravil
Kompleksni oddelek za podporno
farmacevtsko službo julijskega območja
Priloga 9.5 Postopek za Janssen COVID-19
Vaccine®



Kaj lahko pričakujete po
cepljenju proti covidu
19 s cepivom Janssen
COVID-19 Vaccine®

Možni neželeni učinki

- Glavobol
- Slabost
- Mialgija/artralgija
- Utrujenost
- Bolečina/oteklina na mestu vboda
- Kašelj
- Vročina
- Mrzlica



V primeru vročine vzemite 500 mg paracetamola (do največ 3000 mg na dan, razdeljenih na 6 odmerkov).

Ali lahko po cepljenju opravljam vsakodnevna opravila?

Da, a upoštevajte naslednja priporočila:

- če vas boli roka, ne dvigujte težkih predmetov
- če ste utrujeni, počivajte ter se izogibajte vožnji in upravljanju strojev.




Ali lahko zaradi cepljenja zbolimo za covidom 19?

Ne, možno je, da ste bili okuženi že pred cepljenjem, a niste imeli simptomov.

Trombocitopenija in motnje koagulacije

Pri osebah, ki se zdravijo z antikoagulantni ali imajo težave s strnjevanjem krvi, je možen pojav krvavitav ali modric okoli mesta vboda.



Nemudoma poiščite zdravniško pomoč, če se v treh tednih po cepljenju pojavi kateri od naštetih simptomov:

- zasoplost
- bolečine v prsih
- otekanje nog
- vztrajne bolečine v trebuhu
- nevrološki simptomi, kot sta hud in vztrajen glavobol ter zamegljen vid
- pojav manjših modric ali rdečkastih madežev po telesu