

Kdaj boste prejeli drugi odmerek cepiva?

Po prejemu prvega odmerka cepiva boste **v 42 dneh** dobili nov termin za drugi odmerek.

Bistveno je, da prejmete oba odmerka cepiva: **en sam odmerek ne ščiti pred virusom.**

Če se na dan drugega odmerka ne počutite dobro, počakajte, da popolnoma okrevate.



Prijava neželenih učinkov po cepljenju

Morebitne neželene učinke po cepljenju lahko prijavite na platformi Vigifarmaco (www.vigifarmaco.it).

Dodatne informacije


Cepivo, ki ste ga prejeli, zmanjšuje možnost, da zbolite za covidom-19, vendar tveganja ne izniči.

Zaščita, ki jo zagotavlja cepivo, se začne vzpostavljati **7 dni** po drugem odmerku.

Še naprej upoštevajte priporočila za preprečevanje širjenja okužbe:

1. omejevanje socialnih stikov
2. nošenje maske
3. pogosto umivanje rok

Shranite t. i. zeleno potrdilo, ki ste ga prejeli po prvem odmerku, in ga **prinesite s seboj na dan drugega odmerka.**



Brošuro je pripravil Kompleksni oddelek za podporno farmacevtsko službo julijskega območja Priloga 9.5 Postopek za COVID-19 COMIRNATY®



Kaj lahko pričakujete po cepljenju proti covidu-19 s cepivom COMIRNATY®

Možni neželeni učinki

Zelo pogosti:

- bolečina , rdeči madeži , oteklina na mestu vboda
- utrujenost
- glavobol
- bolečine v mišicah
- mrzlica
- bolečine v sklepih
- vročina
- driska

Občasni:

- otečene bezgavke
- izpuščaji ali srbenje

Redki:

alergijske reakcije, kot sta:

- koprivnica (izboklina na koži, ki pogosto zelo srbi)
- otekanje obraza, jezika ali grla.



Ali lahko zaradi cepljenja zbolimo za covidom-19?

Ne, možno je, da ste bili okuženi že pred cepljenjem, a niste imeli simptomov.



Ne hodite na cepljenje, če:

- imate pred cepljenjem simptome, ki jih je mogoče pripisati covidu-19
- ste v samoizolaciji
- čakate na rezultat brisa.

Ali lahko po cepljenju opravljam običajna vsakodnevna opravila?

Da, a upoštevajte naslednja priporočila:

- če vas boli roka, ne dvigujte težkih predmetov
- če ste utrujeni, počivajte ter se izogibajte vožnji in upravljanju strojev.

V primeru vročine vzemite 500 mg paracetamola (do največ 3000 mg na dan, razdeljenih na 6 odmerkov).

Poiščite zdravniško pomoč, če dobite visoko vročino, če simptomi trajajo več kot 7 dni ali če se poslabšajo.

